

Tab.9.: Kritéria pro B-symptomy

Vysoká nálož mastocytů: > 30 % infiltrace mastocytárními agregáty v kostní dřeni a/nebo sérová tryptáza > 200 ng/mL nebo mutace <i>KIT</i> p.D816V s VAF > 10 %
Známky dysplázie nebo myeloproliferace v nemastocytární linii krvetvorby ale nejsou splněna kritéria pro jinou myeloidní malignitu (SM-AHN), počet krvinek je v normě nebo jsou početní abnormality mírného stupně
Hepatomegalie bez poškození jaterních funkcí a/nebo hmatná splenomegalie bez hypersplenismu a/nebo lymfadenopatie zjištěná palpačně nebo na zobrazovacích metodách

Tab.10.: Kritéria pro C-symptomy

Dysfunkce dřeně způsobená infiltrací neoplastickými mastocyty, ≥ 1 cytopenie: absolutní počet neutrofilů $< 1 \times 10^9/l$, hemoglobin < 100 g/l, trombocyty $< 100 \times 10^9/l$
Hepatomegalie s poškozením jaterních funkcí, ascites a/nebo portální hypertenze
Kostní postižení, velké (> 2 cm) osteolytické léze skeletu s patologickými frakturami nebo bez nich
Splenomegalie s hypersplenismem
Malabsorpce s váhovým úbytkem (při infiltraci gastrointestinálního traktu neoplastickými mastocyty)